

Čtvrté letošní ohnisko ptačí chřipky v komerčním chovu bylo potvrzeno u kachen na Nymbursku

13.11.2025
Petr Vorlíček

V Praze dne 13. 11. 2025

Tisková zpráva

Čtvrté letošní ohnisko ptačí chřipky v komerčním chovu bylo potvrzeno u kachen na Nymbursku

V komerčním rodičovském chovu kachen firmy PERENA s.r.o. v Nouzově u Dymokur ve Středočeském kraji byla dnes potvrzena vysoce patogenní ptačí chřipka H5N1. V chovu se nyní nachází více než 2000 kusů šestitýdenních kachen. Vzhledem k vysokému úhynu kachen byly odebrány v chovu vzorky a odeslány do Státního veterinárního ústavu Praha. Výsledek vyšetření dnes odpoledne potvrdil ptačí chřipku. Jedná se o čtvrté ohnisko vysoce patogenní ptačí chřipky v komerčním chovu v ČR v letošním roce, z toho třetí v tomto týdnu. Státní veterinární správa (SVS) vyzývá chovatele, aby věnovali maximální pozornost biologické bezpečnosti ve svých hospodářstvích.

Kromě čtyř komerčních chovů bylo v České republice letos dosud potvrzeno 17 ohnisek ptačí chřipky v nekomerčních malochovech. Stejná nákaza byla potvrzena také u uhynulých volně žijících ptáků na osmi místech ČR.

V souladu s platnou legislativou bude zbývající drůbež v chovu utracena. Kolem ohniska bude vymezeno tříkilometrové ochranné pásmo a desetakilometrové pásmo dozoru. V těchto pásmech budou vyhlášena mimořádná veterinární opatření, která omezí přesuny drůbeže, budou zde provedeny soupisy všech chovů drůbeže a bude zakázáno pořádání hromadných akcí jako jsou burzy či výstavy ptactva, které představují velké riziko šíření nákaz drůbeže.

Podzimní období migrace volně žijících ptáků představuje každoročně dobu, kdy výrazně roste riziko šíření ptačí chřipky do chovů. K významnému nárůstu počtu nových ohnisek ptačí chřipky dochází napříč Evropou. Od 1. října 2025 bylo v EU ve 13 členských státech zaznamenáno celkem 122 ohnisek této nákazy v komerčních chovech drůbeže. Polovina z toho se objevila v posledních dvou týdnech. V ohniscích se nacházelo okolo pěti milionů kusů drůbeže, virus cirkuluje v oblastech s vysokou hustotou chovů. Nejvíce se nákaza šíří v sousedním Německu.

Základním preventivním opatřením proti zavlečení ptačí chřipky je chov drůbeže v uzavřených objektech a zabránění kontaktu s volně žijícími ptáky. U chovů, kde není možné zajistit umístění v uzavřeném objektu, je nutné přijmout opatření, která minimalizují riziko kontaminace vody, krmiva a podestýlky trusem volně žijících ptáků, například umístit vodu a krmivo pod přístřešek. Případné podezření na výskyt nákazy, což je zvýšený úhyn drůbeže, náhlý pokles snášky nebo příjmu krmiva, je třeba nahlásit krajské veterinární správě.

Petr Vorlíček
tiskový mluvčí SVS