

# Nemoci přenášené klíšťaty

05.05.2022

Klíšťata představují pro naše domácí miláčky možný zdroj různých infekčních onemocnění a parazitóz. Není to však tak, že by jeden druh klíštěte přnášel všechna klíšťaty přnášená onemocnění. Proto při podezření na onemocnění přnášené klíšťaty bereme v úvahu zachycený druh klíštěte, respektive geografickou oblast, ve které se pacient nacházel, díky níž můžeme některé infekce vyloučit, či považovat za méně pravděpodobné.

V rámci České republiky se setkáváme nejčastěji (z hlediska rizika nákazy) s klíštětem obecným (*Ixodes ricinus*) nebo pijákem lužním (*Dermacentor reticulatis*). Piják hnědý (*Rhipicephalus sanguineus*) je rozšířen zejména v oblasti Středomoří.

Klíště obecné je známým přnášečem zejména lymfské boreliózy, anaplazmózy (*Anaplasma phagocytophilum*) nebo klíšťové encefalitidy. Z těchto tří onemocnění se klinicky nejčastěji setkáváme s anaplazmózou, která způsobuje u psů horečky, kulhání, nebo problémy se srážením krve. Borelióza na rozdíl od lidí nezpůsobuje typické kruhovitě zarudnutí kůže, ale může vést k onemocnění ledvin. Je zvažována i souvislost s onemocněním pohybového aparátu. Klíšťová encefalitida má nejdramatičtější průběh a způsobuje onemocnění nervového systému.

Piják lužní je významným přnášečem babeziózy. Babezióza způsobuje rozpad červených krvinek a vede ke chudokrevnosti. Onemocnění může mít rychlý průběh a u některých psů se projevuje zbarvením moči do červeno-hněda (to může mít však řadu jiných příčin). Babezií poznáme více druhů, mohou se lišit intenzitou a typem klinických příznaků, přnášečem a tím pádem rozdílnou geografickou pravděpodobností výskytu a rovněž léčbou. Výskyt pijáka lužního monitoruje projekt [www.najdipijaka.cz](http://www.najdipijaka.cz).

Piják hnědý přnáší mimo jiné ehrlichiózu a další druh anaplazmózy (tzv. *Anaplasma platys*) - obě tato onemocnění se projevují poruchou srážením krve. Kromě uvedených onemocnění se mohou zvířata nakazit hepatozoonózou - zde dochází k nakažení v důsledku pozření klíštěte (a proto nejsou preventivní antiparazitární opatření účinná). Hepatozoonóza má tzv. nespecifické příznaky ve formě horečky, či zvětšených mízních uzlin a aktuálně patří u nás ke vzácnějším onemocněním.