

Pozor na kožní myiázu králíků

28.08.2025

Martin Grym



V letním vlhkém a deštivém období se začaly v našich ordinacích objevovat případy tzv. myiázy králíků. Jde o dost hororové onemocnění, které postihuje především králíky s horším hygienickým standardem, znečištěné trusem a močí v zadních partiích těla. Zápach láká mouchy, které nakladou na znečištěnou srst králíka v okolí ocasu svá vajíčka, ze kterých se v řádu hodin líhnou desítky až stovky larev. Ty poté provrtávají poškozenou kůži a následně vyžírají podkožní tkáň.



Masivní napadení mušími larvami v oblasti genitálií a konečníku,

zdroj: <https://www.barrowbunnies.com/health.html>

Predisponováni jsou králíci chovaní v horších hygienických podmínkách, ale také králíci, jimž brání v efektivní péči o srst onemocnění zubů, či bolestivé klouby a páteř. Příčinou znečištění mohou být i záněty močových cest doprovázené únikem moči, měkká stolice nalepená na srsti, popř. i obezita. Znečištěný králík pak v důsledku své neschopnosti o sebe pečovat představuje bezmocný zdroj výživy pro muší larvy.

Chovatelé si nejčastěji všimnou nepříjemného zápachu, apatie králíka a následně objeví v oblasti ocasu, genitálií a řitního otvoru rychle lezoucí bílé larvy, laicky označované jako červi. Bližší zkoumání postižené oblasti pak obvykle ukáže hnisající až odumřelou tkáň, po které lezou desítky až stovky larev.

Pro králíka jde o velmi vážný stav. Onemocnění je nezřídka spontánně fatální, nebo je zděšeným chovatelem vyžádána eutanázie. Prevencí je především v teplém a vlhkém období řádná hygiena, udržování králíka v čistotě, umístění sítí proti hmyzu do oken, ev. použití mucholapek. Pokud chovatel toto onemocnění objeví, měl by urychleně vyhledat veterinárního lékaře.

Ošetření spočívá k ostříhání srsti v postižené oblasti, odstranění larev, toaletě rány, aplikaci léků proti bolesti a antibiotika. Řada králíků vyžaduje také podpurnou terapii v podobě infuzí a výživy včetně hospitalizace. Prognóza závisí na rozsahu postižení tkáně a celkového stavu zvířete. Jak již bylo zmíněno výše, někdy je řešením eutanázie.



Muší larvy v otevřené ráně,

zdroj: <https://veteriankey.com/fly-strike-in-a-rabbit-myiasis/>

Martin Grym