

Mezinárodní den veverek

21.01.2026

Dnešní den patří veverkám. Mezinárodní den veverek vznikl v USA v roce 2001. Christa Hargrová ze záchranné stanice v Severní Karolíně chtěla zlepšit vztah lidí k těmto zvířatům, protože veverky byly v USA považovány spíše za škůdce a byly kvůli tomu pronásledovány.



Veverka berberská (Atlantoxerus getulus) - Jebel Toubkal

U nás byl přístup k veverkám podobný, byly hojně loveny a do určité doby i konzumovány. Jejich populace se výrazně snížila, ale dnes už jsou chráněny zákonem a mezi lidmi spíš oblíbené.

V našich končinách žije jediný stromový druh – veverka obecná (*Sciurus vulgaris*). Vyskytují se v několika barevných variantách, nejznámější je rezavá. Srst může být šedohnědá až černá, vždy se světlou náprsenkou a spodinou břicha. Některými lidmi jsou tmavě zbarvené veverky mylně považovány za nepůvodní invazní druh. U nás se ale jiný druh veverek ve volné přírodě nevyskytuje, na rozdíl od Velké Británie a Itálie, kde se zabydlela veverka popelavá (*Sciurus carolinensis*) původem ze Severní Ameriky.

Naše veverky jsou původně lesním druhem, dnes je běžně potkáme v parcích nebo větších zahradách. Veverky si staví hnízda, která slouží nejen k rozmnožování ale i k přespávání a jako úkryt před nepříznivým počasím.



Veverka berberská (Atlantoxerus getulus) při přenášení mláděte - Jebel Toubkal 4167 m.n.m

Potrava:

Živí se semínky ze šišek, ořechy různými plody, pupeny, houbami, ale i ptačími vejíčky a mláďaty. Houby si napichují na větvičky v okolí hnízda. Z ořechů a semen si vytvářejí spižírny. Občas je můžeme vidět na ptačích krmítkách

Pohyb:

Veverky dokážou běžet rychlostí až 19 km/h. Jsou velmi dobrými skokany a zvládnou tak překonat i šestimetrovou vzdálenost. Huňatý ocas slouží při pohybu k udržení rovnováhy.



Rozmnožování:

Veverky mají mláďata 2-3x do roka. První mláďata se rodí už na konci února. Po narození jsou holá a slepá. Občas se může stát, že mládě z hnízda vypadne. Pokud takové mládě najdete, potřebuje okamžitou pomoc. Důležité je zajistit teplotní komfort – mládě zabalit do hřejivé látky a doma umístit do krabice ve vytápěné místnosti. Následně je na místě kontaktovat záchrannou stanici (stanice Pinky se zaměřuje pouze na veverky):

<http://www.veveratka.cz/> tel: 606 070 632

Důležité je mláďata ničím nekrmit bez porady se záchrannou stanicí. A pokud se rozhodnete navštívit s mládětem nebo poraněnou veverkou veterináře, ujistěte se, že má s veverkami zkušenost. Některé běžně používané léky u jiných druhů zvířat jsou pro veverky toxické!

Nesnažte se odchovat mládě sami. Nevhodná potrava může způsobit vážné zdravotní komplikace s následným úhynem. Další problémem může být špatně vyvážený obsah vitamínů a minerálů, což je příčinou vývojových vad pohybového aparátu.

Navíc laikem odchované mládě již nepůjde vrátit zpět do přírody.

Díky ochraně dané zákonem je navíc držení veverky v domácnosti bez povolení nelegální.



Veverka obecná (Sciurus vulgaris) tmavá forma městský park Hradec Králové

Jiné druhy veverek

Do čeledi veverkovitých patří přibližně 270 druhů. Patří sem i sysel, psoun prériový nebo poletucha. Kromě typických stromových veverek jsou poměrně populární zemní druhy. Animovaný seriál Chip a Dale proslavil americké čipmanky (*Neotamias minimus*). Ve veterinární ordinaci se občas setkáváme s burunduky páskovanými (*Tamias sibiricus*) původem z Asie. Jejich chov není extra náročný, ale je potřeba dbát na správné složení jídelníčku (při nevhodné stravě budou můžou trpět obezitou, problémy se zuby a zažíváním nebo metabolickými poruchami). Počítejte také se značnou pohybovou aktivitou, únikovými reakcemi a také s tím, že to nebudou zvířátka na mazlení.



Veverka indická (*Funambulus palmarum*) - Dickwella, Srí Lanka