

Příliš velká moucha

02.07.2026

MVDr. Veronika Grymová



Jednou z mála nevýhod léta je zvýšení aktivity obtížného hmyzu, kterému se lidé snaží různým způsobem

bránit. Mezi používané metody patří i mucholapky v podobě lepivých pásů zavěšovaných nejčastěji v interiérech.

Problém nastává, pokud se na mucholapku přilepí pták chovaný v domácnosti, nejčastěji když v letu neodhadne bezpečnou vzdálenost od visící hmyzí pasti. Proto mají ptáci nejčastěji postiženy konce křídel, ovšem při následných panických pokusech se vyprostit se lepidlo z mucholapky dostává i na jiné části těla.

Následně pak chovatelé oslovují veterinární lékaře s dotazy, jak lepidlo z peří odstranit. Někteří se potřebují i ujistit, že lepidlo neobsahuje žádné jedovaté látky, které by mohly papouškovi či kanárkovi ublížit.

Jaký je správný postup odstranění lepidla z peří? Chovatelé musí být důrazně upozorněni, že nesmí použít žádné organické rozpouštědlo typu alkoholu, acetonu nebo benzínu. Tyto látky mohutně prostupují kůži ptáků a systémově se vstřebávají s potenciálně letálními účinky. Nejbezpečnější a nejrychlejší způsob je postižené peří odstříhat, i za cenu kosmeticky neuspokojivého efektu, který je ale pouze dočasný, do příštího přepeření. Osvědčit se může důkladné poprášení peří kontaminovaného lepidlem hladkou moukou, což zabrání další lepivosti a vzniklý materiál lze snadněji oddrolit. Někdy je možné lepivý materiál z peří setřít v podobě žmolků otíráním hadříkem namočeným v teplé vodě s trochou vlasového šampónu. To ale vyžaduje velmi trpělivého pacienta a příznivé složení konkrétního lepu mucholapky, na který je tato metoda vhodná.

MVDr. Veronika Grymová